



Brote de Norovirus en las costas de Hawaii

El virus enfermó a 67 pasajeros y a 14 miembros del personal en un crucero de Pride of America en Enero.

- Algunos enfermos de norovirus no presentan síntomas
- Las personas infectadas pueden transmitir grandes cantidades de norovirus en sus vomito y heces. La transmisión de virus por las heces puede ocurrir hasta 3 semanas después de que los síntomas hayan desaparecido.
- La mayoría de los brotes de norovirus reportados son asociados con servicios culinarios o eventos.
- El norovirus puede sobrevivir en superficies comunes de la cocina de 3 a 6 semanas por lo menos.
- Algunos desinfectantes de mano no son efectivos para eliminar el norovirus de las manos.



Brotos de Norovirus han sido vinculados a manipuladores de alimentos quien recientemente habían cuidado a familiares enfermos del virus.

Docenas de pasajeros y miembros del personal de abordo con un brote de norovirus, sufrieron vómitos y diarreas en un crucero que se llevó a cabo del 17 al 24 de Enero en las aguas de Hawaii a bordo del crucero Noruego "Pride of America."

"El Norovirus siempre es un problema en ambientes cerrados, cuando hay muchas personas diferentes en estrecha



relación," dijo Dr. Alan Tice, consultor en enfermedades contagiosas. "A veces la diarrea se vuelve seria y el paciente tiene que ser hospitalizado, puede ser miserable."

Lavarse las manos debidamente y una sanitacion apropiada son importantes para controlar brotes de norovirus, sea en un crucero, guardería de niños, o en un restaurant.